

## Registro do saí-canário *Thlypopsis sordida* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) (Aves, Thraupidae) no Estado de Santa Catarina, sul do Brasil

Ivo Rohling Ghizoni-Jr.<sup>1\*</sup>  
Elsimar Silveira da Silva<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 376/303, Pantanal, 88040-001, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil  
ivoghizoni@yahoo.com.br

<sup>2</sup>Rua Jornalista Nicolau Nagib Nahas, 296, Carianos, 88047-570, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil  
stobpi@yahoo.com.br

\* Autor para correspondência

Submetido em 11/10/2005  
Aceito para publicação em 27/12/2005

### Resumo

O saí-canário *Thlypopsis sordida* (Aves, Thraupidae) é uma ave de dossel que ocorre desde a Venezuela, Bolívia, Paraguai e Argentina e em todo o Brasil até o Estado do Paraná. Nos dias 8 e 20 de agosto de 2005 foram observados indivíduos de *T. sordida* na ponta da Divinéia (26°53'41"S e 48°39'38"W), município de Navegantes às margens do rio Itajaí-Açu, situado do lado oposto do porto de Itajaí. O registro foi em ambiente de floresta de planície quaternária, entremeada com campos de pastagem alterada pela presença constante e intensiva de gado. Esse registro de *T. sordida* é o primeiro para o Estado de Santa Catarina. Aparentemente a espécie está em processo de ampliação de sua área de distribuição, em consequência da degradação e fragmentação de seu habitat.

**Unitermos:** aves, Thraupidae, *Thlypopsis sordida*, ocorrência, Santa Catarina, Brasil, distribuição

### Abstract

**Record of orange-headed tanager *Thlypopsis sordida* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) (Aves, Thraupidae) in Santa Catarina state, southern Brazil.** The orange-headed tanager *Thlypopsis sordida* (Aves; Thraupidae) is a canopy bird that occurs in Venezuela, Bolivia, Paraguay and Argentina and in the part of Brazil extending from the extreme south up to Paraná state. On days 8 and 20 of August 2005, individuals were observed in the Ponta da Divinéia (26°53'41"S and 48°39'38"W), city of Navegantes, to the banks of the Itajaí-Açu river, situated on the opposite side of the port of Itajaí. The sighting was registered in quaternary plain forest, surrounded by fields of pasture modified for the constant and intensive presence of cattle. This record of *T. sordida* is the first ever for the state of Santa Catarina. Apparently, the species is extending its distribution range due to the fragmentation of its habitat.

**Key words:** birds, Thraupidae, *Thlypopsis sordida*, occurrence, Santa Catarina, Brazil, distribution

O saí-canário *Thlypopsis sordida* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) (Aves, Thraupidae) é um passeriforme com ampla distribuição na América do Sul, desde a

Venezuela, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Argentina e em todo o Brasil, ao sul até o Paraná (Ridgely e Tudor, 1989; Sick, 1997). A espécie tem como

hábitat o dossel de árvores e bosques, mesmo no centro de cidades (Argel-de-Oliveira, 1997; Sick, 1997).

Nos dias 8 e 20 de agosto de 2005, durante o diagnóstico da fauna para a ampliação do porto de Itajaí (26°53'41"S e 48°39'38"W), município de Navegantes, Santa Catarina, foram observados pela primeira vez no Estado indivíduos do saí-canário. Na primeira ocasião, um indivíduo macho foi observado forrageando em um eucalipto isolado. Cerca de meia hora após um casal foi visto, a cerca de 400 metros de distância do local do registro anterior, movimentando-se ativamente no dossel em floresta quaternária. Neste mesmo local, no dia 20, um casal foi novamente observado.

O ambiente onde foram feitas às observações é uma floresta de planície quaternária bastante alterada devido à presença constante e intensiva de gado, sendo o sub-bosque relativamente aberto. Esse ambiente é isolado, de um lado, pelo rio Itajaí-Açu e o porto de Itajaí e, do outro, pela cidade de Navegantes.

Abe (1998) e Arzua et al. (2001) observaram esta espécie no sul e sudeste do Paraná e discutiram a possibilidade de a espécie estar ampliando sua área de distribuição uma vez que, no Paraná, sua ocorrência era conhecida somente para a região norte e nordeste do Estado (Straube et al., 1996). Nossos registros podem indicar que a espécie talvez esteja ampliando sua distribuição através da planície quaternária desde o litoral do Paraná até Santa Catarina, uma distância de cerca de 200 km ao sul da distribuição conhecida até então, provavelmente devido ao desmatamento. A avifauna da região do vale do Itajaí é uma das mais bem conhecidas do Estado de Santa Catarina (Zimmerman 1991, 1995 e 2000; Marterer, 1996), entretanto *T. sordida* não havia sido registrada.

## Agradecimentos

Somos gratos a Caruso-Jr. Projetos Ambientais pela possibilidade de realização do trabalho. Ao Jorge José Cherem, Marcos Antonio Guimarães Azevedo e Vitor de Queirós Piacentini pela revisão e sugestões ao texto.

## Referências

- Abe, L. M. 1998. Registro de saí-canário (*Thlypopsis sordida*) d'Orbigni & Lafresnaye, 1837 (sic), na região sul do estado do Paraná (Aves; Passeriformes; Emberizidae). **Atualidades Ornitológicas**, **81** (4): 4.
- Arzua, M.; Scherer-Neto, P.; Figueiredo, G. J.; Carrano, E.; Ribas, C. F.; Rachwald, M. 2001. Novos registros de saí-canário *Thlypopsis sordida* (Emberizidae) no Estado do Paraná, com comentários sobre sua distribuição. **Ararajuba**, **9** (2): 143-144.
- Argel-de-Oliveira, M. M. 1997. O papel do eucalipto (*Eucalyptus* sp.) na alimentação de aves urbanas em São Paulo, Brasil. **Actas del Encuentro Boliviano para la Conservación de las Aves**, **3**, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, p.67.
- Marterer, B. T. P. 1996. **Avifauna do Parque Botânico do Morro do Baú. Riqueza, aspectos de frequência e abundância**. FATMA, Florianópolis, Brasil, 74pp.
- Ridgely, R. S.; Tudor, G. 1989. **The birds of South America**. V. 1. The Oscine Passerines, Austin, University of Texas, USA, 516pp.
- Sick, H. 1997. **Ornitologia Brasileira**. Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, Brasil, 912pp.
- Straube, F. C.; Bornschein, M. R.; Scherer-Neto, P. 1996. Coletânea da avifauna da região Noroeste do Estado do Paraná e áreas limítrofes (Brasil). **Arquivos de Biologia e Tecnologia**, **39**: 193-214.
- Zimmermann, C. E. 1991. **Contribuições à ornitologia catarinense: levantamento preliminar da avifauna da bacia hidrográfica do Itajaí**. Monografia, Bacharelado, Universidade Regional de Blumenau, Brasil, 30pp.
- Zimmermann, C. E. 1995. Novas informações sobre a avifauna do parque ecológico Artex. **Biotemas**, **8** (1): 7-20.
- Zimmermann, C. E. 2000. Avifauna de um fragmento de floresta Atlântica em Blumenau, Santa Catarina. **Revista de Estudos Ambientais**, **1** (3): 101-113.