

Ocorrência do urubu-de-cabeça-amarela *Cathartes burrovianus* no município de Ouro, oeste do estado de Santa Catarina

**Cássio Amaral
Viviane Amaral**

Instituto de Pesquisas Cananéia – IPeC
Rua Mato Grosso, 562, apto. 32, Água Verde, Curitiba-PR, CEP: 80620-070
e-mail: cassiobio@yahoo.com.br

Aceito para publicação em 21/08/2002

Resumo

Cathartes burrovianus, urubu-de-cabeça-amarela, possui uma ampla distribuição geográfica na América Latina, sendo considerado raro para o estado de Santa Catarina. Este trabalho visa contribuir para o conhecimento da distribuição geográfica desse animal, no estado de Santa Catarina. No dia 15 de julho de 1999 foi observado um exemplar dessa espécie no município de Ouro, estado de Santa Catarina.

Unitermos: Urubu-de-cabeça-amarela, distribuição geográfica, Santa Catarina

Summary

Cathartes burrovianus, lesser yellow-headed vulture, presents a wide geographic distribution in Latin America and is considered rare species in State of Santa Catarina. This work aims

at contributing to the knowledge about the geographic distribution of this bird in Santa Catarina State. On July 15th, 1999, a specimen was observed in the city of Ouro, Santa Catarina State.

Key words: Lesser yellow-headed vulture, geographic distribution, Santa Catarina State

O urubu-de-cabeça-amarela *Cathartes burrovianus* (Cathartidae) vive em beiras de rios cercadas por matas e pântanos, geralmente distantes de áreas agrícolas (Sick, 1997), florestas e campos (Rosário, 1996). Ocorre do México ao norte da Argentina e em todas as regiões do Brasil, principalmente na Amazônia e no Nordeste (Sick, 1997). A espécie é rara em Santa Catarina, Estado que possui pelo menos dois registros: na serra do Quiriri, em outubro de 1978, e na serra Dona Francisca, em outubro de 1993, ambos no município de Joinville, nordeste do Estado, em área de Floresta Ombrófila Densa (Rosário, 1996). No estado do Paraná, esta espécie foi registrada no sul da Ilha Grande, Altônia, em 1989 e em diversos locais ao longo do rio Paraná, no extremo noroeste do Estado, segundo Scherer-Neto e Straube (1995). É residente na maior parte do estado do Rio Grande do Sul, com exceção do extremo norte, planalto central e nordeste (Belton, 1994). O presente trabalho tem como objetivo contribuir para o conhecimento da distribuição geográfica do urubu-de-cabeça-amarela, no estado de Santa Catarina. No dia 15 de julho de 1999 observamos um urubu-de-cabeça-amarela às margens da rodovia SC-303, a pouco mais de 1 km da área urbana do município de Ouro (51°37' oeste, 27°10' sul), num pequeno fragmento de Floresta Estacional Decidua, às margens do rio do Peixe, cercado por plantações, pastagens, capoeiras e outros fragmentos da Floresta. O animal encontrava-se em repouso num umbu *Phytolacca dioica* (Phytolaccaceae), próximo a três indivíduos de *Coragyps atratus*, urubu-de-cabeça-preta. Aparentemente, o animal estava apenas de passagem, pois este não foi mais visualizado na região.

Agradecimentos

Agradecemos o auxílio de Michelle Pereira de Sousa.

Referências Bibliográficas

- Belton, W. 1994. **Aves do Rio Grande do Sul: Distribuição e Biologia**. Unisinos, São Leopoldo, 584 pp.
- Rosário, L. A. do. 1996. **As aves em Santa Catarina: distribuição geográfica e meio ambiente**. FATMA, Florianópolis, 326 pp.
- Scherer-Neto, P.; Straube, F. C. 1995. **Aves do Paraná: história, lista anotada e bibliografia**. Ed. dos Autores, Curitiba, 79 pp.
- Sick, H. 1997. **Ornitologia brasileira**. 2. ed. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 862 pp.