

Confirmação do beija-flor-de-tesoura (*Eupetomena macroura*) (Aves, Trochilidae) no Estado do Rio Grande do Sul

Elisa de Souza Petersen

Maria Virginia Petry*

Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos
CEP 93022-000, São Leopoldo – RS, Brasil

*Autor para correspondência
vpetry@unisinos.br

Submetido em 18/06/2009
Aceito para publicação em 13/08/2009

Resumo

O beija-flor-de-tesoura (*Eupetomena macroura*) é registrado em todas as regiões do Brasil. Entretanto, a sua ocorrência no Rio Grande do Sul ainda não havia sido confirmada através de registro documentado. Esta nota relata o registro fotográfico da espécie em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Unitermos: *Eupetomena macroura*, registro documentado, sul do Brasil

Abstract

Confirmation of *Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788) for the state of Rio Grande do Sul. The Swallow-tailed Hummingbird (*Eupetomena macroura*) is recorded for all Brazilian regions. However, there is no documented record for the state of Rio Grande do Sul, southern Brazil. This note reports a photographic record of the species for the municipality of Capão da Canoa, northern coast of Rio Grande do Sul.

Key words: *Eupetomena macroura*, documented record, southern Brazil

O beija-flor-de-tesoura, *Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788), é um dos maiores beija-flores do Brasil, com cerca de 18cm de comprimento total. Apresenta como característica cabeça e pescoço azulado e o restante do corpo com plumagem verde, sendo que a cauda bifurcada representa cerca de 2/3 do seu tamanho (Sick, 1997).

Distribui-se desde as Guianas até o Paraguai (Sick, 1997). Na Argentina sua presença foi confirmada recentemente (Chebez et al., 2006). No Brasil pode ser encontrado em diversos ambientes, como no Cerrado,

na Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal em algumas localidades na Amazônia (Sick, 1997). Habita desde capoeiras, florestas e suas bordas, jardins e até mesmo áreas bem urbanizadas (Sick, 1997; Develey e Endrigo, 2004). Na Região Sul, tem presença confirmada no Paraná (Mendonça e Anjos, 2005; Straube et al., 2006) e em Santa Catarina (Rosário, 1996; Straube et al., 2006).

No Rio Grande do Sul, Ruschi (1956) mencionou ter coletado um espécime nos arredores de Porto Alegre (3. VII. 1956), enquanto Belton (1994) comenta que

W. A. Voss avistou a espécie no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul em março de 1976. Apesar desses registros, a aparente inexistência do espécime de Ruschi (1956), aliada à falta de documentação através de peles depositadas em museus ou fotografias fez com que a espécie fosse excluída da lista principal das aves do Rio Grande do Sul e considerada de ocorrência provável no Estado por (Bencke, 2001).

Em 6 e 7 de dezembro de 2008 e 31 de janeiro de 2009 um indivíduo de *E. macroura* foi observado e fotografado no município de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul, a 200m da praia (Figura 1). A ave permaneceu no mesmo local durante os três dias em que foi registrada, alimentando-se do néctar das flores de *Hibiscus* sp (Malvaceae). Na mesma ocasião, também foi registrado comportamento de defesa de recurso alimentar, uma vez que o indivíduo afugentava

outras espécies de beija-flores que se aproximavam da área, tais como *Hylocharis chrysura* (Shaw, 1812) e *Leucochloris albicollis* (Vieillot, 1818).

Este registro confirma a presença da espécie no Rio Grande do Sul. Straube et. al. (2006) comentaram que a espécie pode estar em processo de expansão de sua distribuição geográfica nos estados do Paraná e Santa Catarina em decorrência dos processos de fragmentação florestal.

Referências

- Belton, W. 1994. **Aves do Rio Grande do Sul: Distribuição e biologia**. Unisinos, São Leopoldo, Brasil, 584pp.
- Bencke, A. G. 2001. **Lista de referência das aves do Rio Grande do Sul**. Fundação Zoobotânica do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, 104pp.
- Chebez, J. C.; Castillo, R.; Güller, R.; Ferrari, C. 2006. Confirmación de la presencia del picaflor tijereta (*Eupetomena macroura*) en Argentina. **Hornero**, **21**: 49-51.
- Develey, P. F.; Endrigo, E. 2004. **Guia de campo Aves da Grande São Paulo**. Aves e Fotos, São Paulo, Brasil, 295pp.
- Mendonça, L. B.; Anjos, L. 2005. Beija-flores (Aves, Trochilidae) e seus recursos florais em uma área urbana do Sul do Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, **22**: 51-59.
- Rosário, L. 1996. **As aves em Santa Catarina, distribuição geográfica e meio ambiente**. FATMA, Florianópolis, Brasil, 326pp.
- Ruschi, A. 1956. A trochilifauna de Porto Alegre e arredores. **Boletim do Museu de Biologia Professor Mello-Leitão**, **18**: 1-9.
- Sick, H. 1997. **Ornitologia Brasileira**. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, Brasil, 862pp.
- Straube, F. C.; Urben-Filho, A.; Piacentini, V. Q. 2006. O beija-flor-tesoura *Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788) e sua ampliação de distribuição pelo sul do Brasil. **Atualidades Ornitológicas**, **132**: 49-51.



FIGURA 1: Beija-flor-de-tesoura, *Eupetomena macroura*, registrado em Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Foto de Elisa Petersen, 2008.